

VACAS NO AMBULATORIAS

5
CAUSAS
COMUNES

PREVENCIÓN

- 1 Verificar que las vacas **consuman una ración balanceada** para evitar enfermedades metabólicas y para controlar su condición corporal
- 2 Asegurar que las vacas se **levanten inmediatamente después del parto**
- 3 **Observar diariamente a las vacas** para identificar aquellas que no muestran un comportamiento normal
- 4 Asegurar que los **empleados sean entrenados** en el manejo tranquilo de la vaca y que los pasillos estén limpios para **evitar que las vacas se caigan o resbalen** y para que sus patas y piernas tengan el apoyo adecuado

El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige que los empleados sean entrenados en el cuidado animal

Plan de Salud del Hato

PLAN



- 1 Identificar **a la persona que ha sido entrenada** y que hay que llamar en caso que tengamos una vaca no ambulatoria
El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige que los empleados sean entrenados en el cuidado animal
- 2 Tener un equipo de personas **entrenado para mover correctamente** a una vaca no ambulatoria
Consulte el Manual de Referencia del Cuidado Animal del programa FARM que señala las medidas apropiadas cuando se utilice equipo para maniobrar a las vacas caídas
- 3 Tener un **protocolo** escrito para las vacas no ambulatorias
El Programa Nacional FARM de Ganado Lechero exige protocolos escritos actualizados para el manejo de ganado no ambulatorio
- 4 Tener un **área hospital identificada**
- 5 **PERMANECER TRANQUILOS**


CUIDADOS

- 1 Poner una **buena cantidad de cama** por lo menos de 6" de grosor – la mejor cama es la de arena
- 2 Proporcionar **un lugar seguro que la proteja** del sol, lluvia, etc. y lejos de otras vacas
- 3 Poner **agua y alimento en comederos y bebederos** que no se volteen y de fácil acceso – **revisar, dos veces al día, que tengan agua y alimento**
- 4 Levantar a la vaca siguiendo el **protocolo correcto** o voltearla para que cambie de lado dos veces al día
- 5 Consultar a su veterinario acerca del **plan de tratamiento correcto** para la vaca
- 6 **Nunca arrastre a la vaca**



AYUDE A LA VACA A LEVANTARSE SI

Se ha realizado el examen físico y se ha dado el primer tratamiento, y si la vaca:



- Está atenta y alerta
- No tiembla mucho o no tiene muchos espasmos
- No presenta ningún signo de alguna enfermedad grave
- No se ve demasiado débil
- Parece que las extremidades (patas) están normales y las mueve

1

FIEBRE DE LECHE

Síntomas: decaimiento/ debilidad; temblores/ espasmos; temperatura por debajo de los 101°F; orejas caídas

2

MASTITIS TÓXICA

Síntomas: decaimiento/ debilidad; temperatura (muy alta o muy baja); ojos hundidos; leche anormal; un cuarto de ubre (o más de uno) caliente(s), con dolor e inflamado(s)

3

METRITIS TÓXICA

Síntomas: decaimiento/ debilidad; temperatura (muy alta o muy baja); ojos hundidos; descarga vaginal clara, de color o turbia y apesosa

4

DAÑO MUSCULOESQUELÉTICO

Síntomas: Ángulo anormal o inflamación de la extremidad; sospecha de fractura o dislocación; parálisis

5

INFECCIÓN MASIVA

Síntomas: decaimiento/ depresión; ojos hundidos; temperatura (muy alta o muy baja); dificultad para respirar



Para fuentes adicionales visite nationaldairyfarm.com.

